

## ***Бартолинит***



**Бартолинит** - это воспаление железы, которая находится в преддверии влагалища. При этом в выводной проток железы проникают болезнетворные микроорганизмы (стафилококки, стрептококки и др.), появляется отек, покраснение, припухлость.

### **Как же распознать?**

Отек окружающих тканей железы приводит к сужению выводного протока, при этом нарушается отток секрета железы, что создает благоприятные условия для дальнейшего развития воспаления. Данная стадия заболевания называется острым бартолинитом. При этом общее состояние больной ухудшается, температура может подниматься до 39С и выше, появляется озноб, боль в области большой половой губы.

Зачастую бартолинит сопровождается нагноением с образованием абсцесса бартолиниевой железы. Пальпация абсцесса сопровождается сильнейшей болью. При несвоевременном оказании помощи абсцесс может самопроизвольно вскрыться и общее состояние больной улучшается. Однако это не значит, что лечение можно закончить - после вскрытия абсцесса нередко возникает рецидив и заболевание приобретает хронический характер. Если абсцесса не было изначально, при стихании воспалительного процесса в железе накапливается экссудат и возникает «киста» бартолиниевой железы.

### **Как же лечить?**

Бартолинит лечат в стационаре. Воспаление ликвидируется с помощью антибиотиков. Кроме этого пациентке дают обезболивающие препараты. Со стиханием острых явлений лечение может быть дополнено физиотерапевтическими процедурами. При нагноении, показана операция по вскрытию абсцесса. Кисту бартолиниевой железы удаляют хирургическим путем с полным иссечением капсулы.