


Гонорея



Что это такое?

Ежегодно гонореей (по другому – «французский насморк», «триппер») заболевают от 150 до 180 миллионов человек, так что эта венерическая болезнь по праву считается одной из самых распространенных. Первые упоминания о гонорее относятся аж ко II веку до нашей эры. К известному врачу Галену очень часто за помощью приходили пациенты с одинаковыми жалобами: боль при мочеиспускании и желтовато-белые выделения из полового члена. Хорошенько подумав, Гален решил, что сущность неизвестной болезни заключается в самопроизвольном

вытекании семенной жидкости – по-гречески “gonos” («семя») + “rheo” («теку»). Так весь мир узнал о гонорее.

Причина заболевания

Только в 1879 году немецкий дерматовенеролог Альберт Нейссер обнаружил, что гонорею вызывает особый микроорганизм. Если смотреть на него через микроскоп, то он напоминает кофейные зерна. По праву первооткрывателя Нейссер дал бактерии свое имя – *Neisseria gonorrhoeae*. Однако название плохо прижилось, и ее быстро переименовали в «гонококк». Гонорея – это половая инфекция. Следовательно, заразиться ею можно только во время полового акта: генитального, анального или орального. Если человек болен и при этом привык заниматься сексом, не предохраняясь, все его партнеры заразятся триппером.

Но есть и хорошая новость. Заразиться этой болезнью бытовым путем, через мочалки, полотенца и крышки от унитаза – практически нереально. Если Ваш партнер с пеной у рта доказывает, что принес гонорею из бани или бассейна, будьте уверены: на 99%, что он нагло врет. Гонококк – существо достаточно хрупкое, и чтобы выжить, гонококку необходимо все время находиться в организме человека, на воздухе он за несколько минут погибнет.

Что же происходит?

При попадании гонококков в мочеиспускательный канал развивается уретрит (то есть воспаление мочеиспускательного канала). Если гонококки попали во влагалище, возникает кольпит (воспаление влагалища) или цервицит (воспаление шейки матки). В ротовой полости гонококк вызывает стоматит (воспаление полости рта) или фарингит (воспаление горла), а при попадании в прямую кишку – проктит (воспаление прямой кишки).

Как же распознать?

Скрытый период, то есть когда гонококк уже проник в организм, но еще ничего плохого не сделал, длится от нескольких часов до 2-10 суток.

У женщин гонорея часто протекает бессимптомно. Даже если симптомы возникли, их не всегда правильно расценивают. Например, желтовато-белые выделения из влагалища женщины обычно связывают с кандидозом (молочницей); боль при мочеиспускании – с циститом. Однако и то, и другое может быть одним из признаков гонореи. Кроме этого, у женщины могут появиться боли внизу живота и кровянистые выделения в середине менструального цикла.

Гонорея у мужчин проявляется более явно. Из мочеиспускательного канала выделяется желтовато-белая слизь с неприятным запахом, а сам процесс мочеиспускания доставляет массу неприятных ощущений (жжение, боль). Губки на половом члене становятся красными и отекающими, а вокруг могут появляться небольшие язвочки.

Гонококковый фарингит зачастую протекает бессимптомно, но иногда возникает боль в горле. Проктит тоже не всегда можно распознать, только в редких случаях в прямой кишке начинается зуд, и появляются странные выделения.

Чем же опасно?

Если в течении 2-х месяцев гонорею не вылечить, она станет хронической. У женщин хроническая гонорея вызывает воспаление придатков матки – яичников и маточных труб, что в конечном итоге может привести к бесплодию. У мужчин запущенная гонорея также приводит к бесплодию.

Диагноз гонореи

При подозрении на триппер, нужно немедленно обратиться к венерологу либо дерматовенерологу. Сейчас уже, прошли те времена, когда «добрые» врачи сообщали о болезни пациента по месту работы, так что за это переживать не стоит. Сегодня вылечить гонорею можно и анонимно. Практически во всех лечебных учреждениях существуют анонимные кабинеты.

Для того, чтобы поставить диагноз гонорее, врач выслушает жалобы, проведет осмотр и назначит дополнительные исследования. В медицинской лаборатории под микроскопом исследуют выделения, взятые из мочеиспускательного канала (мазок на гонорею с окраской по Грамму), проведут бактериологическое исследование посева с чувствительностью к антибиотикам, возьмут анализ мочи и крови.

Лечение гонорей

Правильно назначить лечение может только врач-венеролог, так как в каждом случае лечение должно назначаться индивидуально, так что о самолечении лучше забыть. Сегодня от гонорей избавляют специальными антибиотиками, а параллельно еще укрепляют иммунитет и назначают физиопроцедуры. Кроме того помните, что пролечиться от гонококковой инфекции должны все заболевшие половые партнеры, иначе после выздоровления произойдет перезаражение.

Профилактика гонорей

1. Обильное мочеиспускание сразу после полового акта может значительно сократить риск заражения.
2. Используйте в течение 2-х часов после полового акта препараты для экстренной профилактики ИППП.