


Уреаплазмоз



Что же такое уреоплазмоз?

Уреоплазмоз – это заболевание, передающееся половым путем. Возбудителем является уреоплазма.

Причина уреоплазмоза.

До сих пор еще неясно, существует ли такое заболевание на самом деле или это фантазия венерологов. Пока известно только то, что иногда, при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы не обнаруживается никаких болезнетворных микроорганизмов, зато в больших количествах определяется уреоплазма. Уреоплазма - это небольшая

дефективная бактерия, ее неполноценность заключается в том, что в ходе эволюции она утратила свою клеточную стенку.

Некоторые ученые считают, что уреоплазма – опасный возбудитель инфекции. Другие считают – что уреоплазма сравнительно безвредна, но в определенных условиях или в сочетании с другими, такими же, на первый взгляд безобидными микроорганизмами может вызывать воспалительные процессы.

Существует только один способ заразиться уреоплазмой: половой контакт с человеком, который уже инфицирован уреоплазмой. В результате контакта половых органов уреоплазма вместе со слизью попадает с головки полового члена во влагалище и наоборот. Бытовое заражение уреоплазмозом (через полотенца, сидения туалетов, бассейн, бани, посуду) весьма маловероятно.

Что же происходит?

Оказавшись в половых путях или в мочеиспускательном канале, уреоплазма может вести себя тихо, а может развить бурную деятельность. Все зависит от изначального состояния здоровья заразившегося человека, от его иммунной системы. В худшем случае уреоплазма начинает быстро размножаться и повреждать все, что попадает у нее на пути. Вот тут то и возникает уреоплазмоз. У мужчин уреоплазма в первую очередь поражает мочеиспускательный канал и предстательную железу, у женщин – влагалище.

В среднем с момента заражения до появления первых признаков болезни проходит около месяца.

Как же распознать?

О том, что они больны уреоплазмозом, **женщины** обычно не догадываются. После сексуального контакта с больным партнером они чувствуют себя прекрасно, никаких неприятных симптомов и болей. Иногда, время от времени появляются прозрачные выделения из влагалища, но они мало отличаются от тех, что бывают в норме. У одной женщины из ста может возникнуть чувство жжения при мочеиспускании. И лишь в том случае, когда уреоплазма уже привела к воспалению матки или придатков, имеются характерные тянущие боли внизу живота.

Мужчинам распознать болезнь проще. Об уреоплазмозе они узнают по прозрачным выделениям из мочеиспускательного канала, умеренной боли и жжению при мочеиспускании, а при хронической инфекции по симптомам простатита.

Чем же опасен уреоплазмоз?

Если уреоплазмоз не лечить, он будет изводить человека годами, то усиливаясь, то затихая. Особенно часто болезнь обостряется при простудных процессах, при стрессах и злоупотреблении алкоголем.

У мужчин уреоплазма может с годами привести к воспалению предстательной железы (простатиту) и сужению мочеиспускательного канала. У женщин – к воспалению матки и спайкам в маточных трубах, а в результате к бесплодию и увеличению риска внематочной беременности. Очень важно избавиться от уреоплазмы до начала предполагаемой беременности, эта инфекция может вызвать проблемы с вынашиванием и нарушение развития плода.

Диагностика уреоплазмоза.

Диагностику уреоплазмоза следует начинать с посещения гинеколога (женщинам) и уролога (мужчинам). Бесплодие и воспалительные процессы в половых органах – серьезный повод сдать анализы на уреоплазму. Обычно, это бактериалогический посев на уреоплазму. Так как в обычном мазке на флору, увидеть уреоплазму нереально, вследствие ее мельчайших размеров. Кроме посева используют другие, сложные дополнительные исследования: ДНК-диагностику (ПЦР) и метод прямой иммуофлуоресценции. Только в том случае, если уреоплазмы обнаружены в большом количестве, и все внешние признаки болезни налицо, врач имеет право ставить

диагноз «уреаплазмоз». При сочетании нескольких половых инфекций потребуются консультация венеролога или дерматовенеролога.

Лечение уреаплазмоза

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением! Если уреаплазму не получится уничтожить сразу, она приспособится к лекарству и дальнейшее лечение станет весьма затруднительным. Основной подход к лечению уреаплазмоза – больной принимает специальные антибиотики в виде таблеток или инъекций. Дополнительно пациенту могут назначить препараты для поднятия иммунитета, массаж предстательной железы, физиопроцедуры. Не забудьте, что лечить придется одновременно всех половых партнеров. В противном случае повторное заражение уреаплазмой неминуемо.

Профилактика уреаплазмоза

При случайных половых связях обязательно следует использовать презерватив. При оральном сексе следует обрабатывать слизистые рта и половых органов антисептическим раствором – хотя бы разбавленной водкой.